

ATRIA DE OLIVAR- VID EL CASTUO

Boletín nº 06/16

OLIVAR

BARRRENILLO (Phloeotribus Scarabaeoides Bern)

Es el momento de coger a los adultos y los huevecillos de este coleóptero dentro de los restos de poda, por lo que es **OBLIGACIÓN** de quemar todos los restos de poda (según normativa del Plan INFOEX), o destruir mediante picado los restos de poda siendo este método el principal para luchar contra esta plaga y algunas enfermedades como aceituna jabonosa.

Todos aquellos agricultores que guarden los leños, estarán obligados a hacerlo en los locales herméticamente cerrados, y para que dichos focos de plaga no se propague se realizarán tratamientos a base de insecticida sobre leños.

PRAYS (*Prays oleae*)

Según los controles de las puestas sobre inflorescencias realizadas por la ATRIA de las zonas olivareras que están próximas a floración, los ataques de esta generación son medio-alto, se recomienda TRATAR, comenzando los tratamientos por las zonas más adelantadas con alguna de la siguiente materia activa:

Materias activas: betaciflutrin, deltametrin, alfa cipermetrin, zeta cipermetrina, Bacillus thuringiensis, dimetoato, etofenprox, fosmet, metil clorpirifos, lambda cihalotrin, cipermetrin, caolin etc.

VID

MILDIU (*Plasmopara vitícola*)

Con las lluvias de estos días se están dando las condiciones para que se produzcan las primeras contaminaciones de la enfermedad, cuyos síntomas (hojas con manchas o racimos atacados) pueden aparecer a partir de los últimos días de abril o primeros de mayo.

Se aconseja a los agricultores que observen bien las parcelas y si ven algún síntoma de estas enfermedades se lo comuniquen al técnico de la ATRIA.

Guareña 8 de Mayo de 2.016.



**Fdo: Eulalia Martín García
Ing. Tec. Agrícola**